



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Assistenza Farmaceutica,
Protesica, Dispositivi Medici
Il Dirigente*

Regione Marche



Alle Direzioni Sanitarie degli Enti del SSR

Alla Federfarma Marche

**Alla Confservizi Centro Italia
Assofarm Marche**

A Farmacieunite

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

**Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
Ospedalieri e Territoriali**

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative sull'uso appropriato del Fentanil - chiarimenti.

Con riferimento alla nota prot. n. 0016847|10/09/2025|R_MARCHE|ARS|ASF|P, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti applicativi.

Il Fentanil è indicato per la gestione del dolore cronico grave che richiede la somministrazione continua a lungo termine di oppioidi ovvero per il trattamento del dolore episodico intenso in pazienti già in terapia di mantenimento con un oppioide per il dolore cronico da cancro (ad esclusione della soluzione iniettabile).

L'AIFA, nella comunicazione di sicurezza pubblicata a giugno 2020, raccomanda ai medici prescrittori di utilizzare tali farmaci in accordo alle indicazioni autorizzate riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e di prevedere un trattamento della durata più breve possibile, al fine di minimizzare il rischio di abuso e dipendenza.

Negli ultimi anni l'utilizzo a scopo voluttuario del Fentanil ha subito un sensibile incremento, pertanto sono state messe in atto dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri misure volte a prevenire e impedire la distrazione del farmaco dal mercato farmaceutico, potenziando, tra l'altro, il monitoraggio dei consumi territoriali.

Il crescente aumento delle segnalazioni di falsificazione di ricette mediche per la prescrizione di oppioidi pone l'obbligo di accrescere l'attenzione del farmacista durante la fase di erogazione del farmaco.

Per tale ragione, nel caso di prescrizioni cartacee da parte del medico specialista, si invitano i farmacisti a verificare che la specializzazione del medico sia attinente alle indicazioni del farmaco (es. oncologia, anestesia e rianimazione, terapia del dolore, cure palliative), contattando preventivamente il medico prescrittore in caso di prescrizioni sospette.

Inoltre, per minimizzare il rischio di falsificazione, si richiede ai medici specialisti e ai Medici di Medicina Generale (MMG)/Pediatri di Libera Scelta (PLS) di prescrivere il farmaco per la terapia del dolore, ove possibile, con ricetta dematerializzata, adottando i formalismi previsti.

Si raccomanda la massima collaborazione di tutti gli operatori sanitari coinvolti, comunicando prontamente eventuali anomalie o prescrizioni sospette agli organismi preposti.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente del Settore
(Chiara Rossi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa